

Demuestra su apoyo
por personas
viviendo con VIH

Día Mundial del SIDA

El 1 de diciembre

#ROCKTHERIBBON
#IWEARREDBECAUSE

En Todo El Mundo



En el 2017, un estimado **36.9 millones** de personas estaban **viviendo con VIH**.



Desde el inicio de la epidemia, **35.4 millones** de personas han **muerdos por una enfermedad relacionada con el SIDA.***




Un estimado **1.8 millón** de personas fueron **diagnosticados con VIH** en el 2017, **una bajada de 47%** desde el colmo de la crisis en el 1996.


VIH Y SIDA en los Estados Unidos

- Hay más de 1.1 millones de personas viviendo con el VIH.
- En el 2016, cerca de 40,000 personas fueron diagnosticados con VIH.
- En el 2016, 18,160 personas fueron diagnosticados con SIDA.


La epidemia del VIH afecta algunos grupos de personas más que otros, incluyendo...



Afroamericanos y Latinos



Hombres gay y bisexuales




Personas viviendo en el sur de los Estados Unidos

Hay muchos factores que contribuyen al riesgo de contraer VIH a una persona y su salud en general. Algunos son:



Educación




Acceso a servicios de salud



Estigma y discriminación



Empleo



Apoyo de la familia y comunidad




Alojamiento seguro y estable

Al adoptar políticas económicas y sociales con impacto positivos a nuestro bienestar y que apoya al comportamiento saludable del individuo, podemos eliminar la desproporcionalidad de VIH en los miembros de nuestra comunidad.





VIH y SIDA en Luisiana



En el 2017, había **21,438 personas viviendo con VIH** en Luisiana.

Más de la mitad tenían diagnóstico previo de sida.

Entre los nuevamente diagnosticados en el 2017, **1 de cada 5 se diagnosticaron atrasados. Los que diagnostiquen atrasados son los que reciben diagnósticos de SIDA entre 6 meses de recibir su diagnóstico de VIH.**




Entre el 2016 y el 2017, **el numero de nuevos diagnósticos** en Luisiana **bajó por 9%.**


Entre personas viviendo con el VIH en el 2017...



2 de cada 3 fueron afroamericanos



71% fueron hombres



Más de la mitad fueron de la edad 45 o mayor

Que se puede hacer USTED para prevenir la transmisión de VIH.



Si está viviendo con VIH, tome sus medicamentos como el doctor se los recete para llegar y **mantener un nivel del virus muy bajo que se llama indetectable** - así se beneficia su salud y al mismo tiempo previene el riesgo de pasar VIH a una pareja.



Conozca su estatus y el estatus de su pareja. **Hágase la prueba del VIH.**



Evite compartir agujas y otros equipos de inyección.



Si no está viviendo con VIH, pregunte al doctor sobre la **profilaxis de preexposición (PrEP)**, una pastilla para prevenir el VIH que se toma una vez al día.

Use condones correctamente cada vez que tenga el sexo.

Condomes reducen el riesgo de contraer VIH, y otras infecciones transmitidas sexualmente.



Hágase la prueba del VIH y **obtenga tratamiento para otras infecciones transmitidas sexualmente (ETS).**



Para información sobre sitios de prueba en Luisiana visite: Lahhub.org