


Día nacional de concientización sobre el VIH/SIDA entre hombres gais y bisexuales

El 27 de Septiembre



En el 2019, había



un millón

personas que vivían con VIH en los Estados Unidos.



Más de la mitad

de las personas que viven con VIH en los Estados Unidos eran **hombres gais y bisexuales.**




El 68%

de hombres gais y bisexuales que viven con VIH en los Estados Unidos han alcanzado

la supresión del virus.

Indetectable = Intransmisible
#lequivaleal


Aquellas personas con VIH que toman sus medicamentos como se les indica y **mantienen la supresión del virus** o es indetectable, no les pueden transmitir el VIH a sus parejas sexuales.



En el 2019, en los Estados Unidos, **2 de 3 nuevos diagnósticos de VIH se encontraban entre hombres gais y bisexuales.**

En el 2019, en los Estados Unidos, **2 de 3 nuevos diagnósticos de VIH se encontraban entre hombres gais y bisexuales.**

La mayoría los hombres gais y bisexuales diagnósticos de VIH son **negros o hispanos/latinos.**



Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Utilice un **condón** correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.




Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la **PrEP**. Una píldora diaria para prevenir el VIH.

VIH entre hombres gais y bisexuales en Luisiana



Más de la mitad de las personas que vivía con VIH en Luisiana en el 2020 era **hombres gais y bisexuales.**



Entre los hombres gais y bisexuales que viven con VIH en Luisiana...

3 de 10 era menor de 35 años.

El 57% era negros, el 32% era blancos.


68% habían alcanzado la supresión del virus.

Alcanzar la supresión viral significa tener lo a un nivel muy bajo en la sangre. Personas con la supresión viral **no se puede** transmitir el VIH a parejas sexuales.



Durante los últimos 10 años, el porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH entre hombre gais y bisexuales ha aumentado del 50% en el 2011 al 63% en el 2020.

Entre los nuevos diagnósticos de VIH en el 2020 en Luisiana, **el 60% era hombres gais y bisexuales (HGB) y un 3% adicional era hombres gais y bisexuales que se inyectan con drogas.**



1 de 3

HGB diagnosticados con el VIH eran **20 a 29 años.**

2 de 3

HGB diagnosticados con el VIH eran **negros.**



Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Utilice un condón correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.



Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la **PrEP**. Una píldora diaria para prevenir el VIH.

Para localizar los centros de pruebas e información sobre el VIH u otra infección de transmisión sexual ve al:



www.lahhub.org



@lahealthhub